

「内科専門医試験 バーチャル模試2024」 正誤表

本番組におきまして、以下の誤りがございました。ここに訂正させていただきますとともに、深くお詫び申し上げます。

回/番組名	時間	該当箇所	誤	正
第1回 第1～20問	0:19:28	第11問 選択肢C	抵抗性の場合、IL-6阻害薬で治療する	抵抗性の場合、 T細胞選択的共刺激調節薬(アバタセプト) で治療する
第1回 第1～20問	0:20:16	第11問 解説	IL-6阻害薬は標準治療ではなく、一部の抵抗性のケースで試験的に使用されることがありますが、一般的な治療法ではありません。	抵抗性の場合にはIL-6阻害薬やTNF阻害薬を評価した臨床試験があり、IL-6阻害薬のトシリズマブについては難治例に対して保険適用となっています。 T細胞選択的共刺激調節薬 (アバタセプト)の使用は推奨されません。
第1回 第1～20問	0:30:58	第17問 正解	c LHとFSHの比率が上昇	e LHとテストステロンが上昇
第1回 第1～20問	0:31:20	第17問 解説	LHのレベルがFSHのレベルに比べて相対的に高くなります。 これにより、LHとFSHの比率の上昇は診断の指標となります。 LH、FSH、テストステロン単体の上昇は診断の指標になりません。	LHのレベルがFSHのレベルに比べて相対的に高くなります。LH、FSH、テストステロン単体の上昇は診断の指標になりません。 (左の赤字部分を削除)
第5回 第81～100問	0:33:41	第98問 正解	e VCA-IgM (-)、VCA-IgG (-)、EBNA (+)	c VCA-IgM (-)、VCA-IgG (+)、EBNA (+)
第5回 第81～100問	0:34:08	第98問 解説	VCA-IgM陽性からほぼ同時かわずかに遅れてVCA-IgGが持続陽性化し、 VCA-IgM、VCA-IgGが陰性化して 数週してからEBNAが持続陽性化します。	VCA-IgM陽性からほぼ同時かわずかに遅れてVCA-IgGが持続陽性化し、 VCA-IgMが陰性化して 数週してからEBNAが持続陽性化します。
第5回 第81～100問	0:36:04	第100問 問題文	37歳の男性。3ヵ月前からザンビアに出張し 1ヵ月前 に帰国。	37歳の男性。3ヵ月前からザンビアに出張し 最近 帰国。
第7回 第121～140問	0:16:50	第130問 解説	一方、 WPW症候群 における発作性上室頻拍に対してベラパミルを急速に静注することは、 禁忌とされています。	一方、発作性上室頻拍に対してベラパミルを急速に静注することは、 WPW症候群の場合、推奨されません(ガイドライン推奨クラス：IIb)。